

Załącznik do programu Rady Wydziału

Imię i nazwisko: Klaudia Domowicz

Data urodzenia: 24.07.1989 r.

Adres e-mailowy: klaudiadomowicz@gmail.com

Wykształcenie: wyższe, lekarz- ukończenie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2014 r.

Miejsce pracy: Szpital im. K.Jonschera w Poznaniu- Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Opolska 58 Poznań, Poradnia Terapii Uzależnień i Zdrowia Psychicznego Os. Zwycięstwa 108 Poznań

Doświadczenie zawodowe, specjalizacja: w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Dorobek naukowy: współautor dwóch artykułów naukowych opublikowanych w „Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii” oraz „Neuropsychiatrii i Neuropsychologii” i dwóch przyjętych do druku w „Psychiatrii Polskiej” oraz „Archives of Psychiatry and Psychotherapy”

Tytuł pracy w języku polskim i angielskim: „Ocena objawów negatywnych schizofrenii za pomocą polskiej wersji skali klinicznej BNSS (Brief Negative Symptom Scale) oraz skali samooceny SNS (Self- assessment of Negative Symptoms)”

„Assessment of negative symptoms of schizophrenia using the Polish version of the clinical scale BNSS (Brief Negative Symptom Scale) and the scale of self-assessment SNS (Self-assessment of Negative Symptoms)”

Słowa kluczowe: schizofrenia, objawy negatywne, skala

Promotor: prof. dr hab. Janusz Rybakowski

Promotor pomocniczy: dr Paweł Wójciak

Założenia i cel pracy

Do objawów negatywnych schizofrenii zalicza się grupę objawów związanych z ubytkiem i ograniczeniem czynności psychicznych jak zubożenie treści i formy myślenia, ograniczenie różnych form aktywności oraz reaktywności emocjonalnej. Objawy negatywne stanowią istotną przyczynę zaburzeń funkcjonowania społecznego i jakości życia pacjentów, ich leczenie jest bardzo trudne i stanowi wyzwanie współczesnej psychiatrii. W pracy doktorskiej ocenie zostanie poddane nasilenie objawów negatywnych schizofrenii z zastosowaniem polskich wersji skal BNSS i SNS. Cele pracy:

- 1) ocena objawów negatywnych schizofrenii za pomocą polskich wersji skal BNSS i SNS
- 2) ocena związku nasilenia objawów deficytowych z objawami psychopatologicznymi ocenianymi za pomocą standardowych skal psychometrycznych
- 3) ocena związku nasilenia objawów negatywnych z zaburzeniami neuropsychologicznymi i zaburzeniami poznania społecznego

Materiał i metodyka pracy

Badanie zostanie wykonane w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ocenie podlegać będzie 60 chorych na schizofrenię w wieku 18-65 lat, w tym 40 hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu otrzymujących stałe dawki leków od co najmniej 3 tygodni oraz 20 pacjentów poradni przyklinicznej w okresie stabilizacji stanu psychicznego otrzymujących stałe dawki leków od co najmniej 3 miesięcy. W badaniu wykorzystane zostaną: BNSS, SNS, PANSS (do oceny objawów pozytywnych, negatywnych i ogólnych schizofrenii), skala Calgary (do oceny objawów depresji), skala Personal and Social Performance (do oceny funkcjonowania społecznego i osobistego), St.Hans Rating Scale (do oceny objawów ubocznych leczenia farmakologicznego, które stanowią istotny czynnik wyzwalania wtórnych objawów negatywnych), do oceny zaburzeń neuropsychologicznych- test łączenia punktów, test Stroopa (ocena pamięci operacyjnej i sprawności uwagi), test sortowania kart Wisconsin, test fluencji słownej, test Digit Symbol oraz testy do oceny zaburzeń poznania społecznego- test oczu, test „dziwne historie”, test „faux- pas”.

Spodziewane wyniki

Dotychczas przebadano 20 pacjentów (10 kobiet i 10 mężczyzn) będących pod opieką ambulatoryjną poradni przyklinicznej oraz 30 pacjentów (18 kobiet i 12 mężczyzn) w trakcie hospitalizacji w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu.